

## Deux thèmes : la trace et une somme de classique



### Exercice de calcul (Chapitre 8, exemple 5)

Une primitive de  $\text{Arctan}$  sur  $\mathbb{R}$  est  $F : x \mapsto \int_0^x \text{Arctan}(t) dt$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . On effectue l'intégration par parties :

$$\begin{aligned} u(t) &= \text{Arctan}(t), & u'(t) &= \frac{1}{1+t^2} \\ v'(t) &= 1 & v(t) &= t \end{aligned}$$

On a alors :

$$F(x) = [t \text{Arctan}(t)]_0^x - \int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt = x \text{Arctan}(x) - \left[ \frac{1}{2} \ln(1+t^2) \right]_0^x = x \text{Arctan}(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2).$$

Ainsi, une primitive de  $\text{Arctan}$  sur  $\mathbb{R}$  est :  $x \mapsto x \text{Arctan}(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ .

Donc les primitives sur  $\mathbb{R}$  de  $\text{Arctan}$  sont

$$x \mapsto x \text{Arctan}(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}.$$



### Inégalité

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .  $f_n$  est impaire, on l'étudie donc sur  $\mathbb{R}^+$ . De plus  $f_n$  est dérivable sur  $\mathbb{R}^+$  et :  $\forall x \in \mathbb{R}^+, f'_n(x) = (1 - 2nx^2)e^{-nx^2}$ .

Donc  $f_n$  est croissante sur  $\left[0, \frac{1}{\sqrt{2n}}\right]$  et décroissante sur  $\left[\frac{1}{\sqrt{2n}}, +\infty\right[$ .

Ainsi, soit  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$|f_n(x)| \leq f_n\left(\frac{1}{\sqrt{2n}}\right).$$

Posons :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = f_n\left(\frac{1}{\sqrt{2n}}\right) = \frac{e^{-1/2}}{\sqrt{2n}}$ . Alors  $(u_n)$  convient.



### Exercice 27 (Chapitre 12, exercice 5)

1. Soient  $A = (a_{i,j})$ ,  $B = (b_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned} \text{tr}(\lambda A + \mu B) &= \sum_{i=1}^n (\lambda a_{i,i} + \mu b_{i,i}) \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda a_{i,i} + \sum_{i=1}^n \mu b_{i,i} \\ &= \lambda \sum_{i=1}^n a_{i,i} + \mu \sum_{i=1}^n b_{i,i} \\ &= \lambda \text{tr}(A) + \mu \text{tr}(B) \end{aligned}$$

2. Soient  $A = (a_{i,j})$ ,  $B = (b_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .  
Posons  $AB = (c_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $BA = (d_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(AB) &= \sum_{i=1}^n c_{i,i} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,i} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n b_{k,i} a_{i,k} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{k,i} a_{i,k} \\ &= \sum_{k=1}^n d_{k,k} \\ &= \operatorname{tr}(BA)\end{aligned}$$

3.
  - Si  $A = 0_n$ , alors  $A^T A = 0_n$  donc  $\operatorname{tr}(A^T A) = 0$ .
  - Supposons  $\operatorname{tr}(A^T A) = 0$ . Alors :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{j,i}^2 = 0.$$

Or :  $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $a_{j,i}^2 \geq 0$ . Ainsi :  $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $a_{j,i} = 0$ . Donc  $A = 0_n$ .

4.
  - Si  $A = B$ , alors  $(\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), AM = BM)$  donc  $(\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \operatorname{tr}(AM) = \operatorname{tr}(BM))$ .
  - Supposons  $(\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \operatorname{tr}(AM) = \operatorname{tr}(BM))$ . Alors :  $(\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \operatorname{tr}((A-B)M) = 0)$ .  
En particulier, pour  $M = (A-B)^T$ ,  $\operatorname{tr}((A-B)(A-B)^T) = 0$ . Donc, d'après 3,  $(A-B)^T = 0_n$ . Ainsi  $A = B$ .



### Exercice 28 (Chapitre 19, exercice 25)

1. Soient  $M = (m_{i,j}), N = (n_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ ,

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(\lambda M + \mu N) &= \sum_{i=1}^n (\lambda m_{i,i} + \mu n_{i,i}) \\ &= \lambda \sum_{i=1}^n m_{i,i} + \mu \sum_{i=1}^n n_{i,i} \\ &= \lambda \operatorname{tr}(M) + \mu \sum_{i=1}^n \operatorname{tr}(N)\end{aligned}$$

Donc  $\operatorname{tr}$  est une forme linéaire.

2. Posons :  $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \operatorname{tr}(M) = 0\}$ . On a  $F = \ker \operatorname{tr}$  et comme  $\operatorname{tr}$  est une forme linéaire non nulle ( $\operatorname{tr}(I_n) = n \neq 0$ ) alors  $F$  est un hyperplan de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  donc :

$$\dim F = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) - 1 = n^2 - 1.$$



## Exercice 29 (Chapitre 19, nouveau)

1. Soient  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$  des bases de  $E$ . On a, en posant  $P = \text{Pass}(\mathcal{B}, \mathcal{C})$  :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = P \text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) P^{-1}.$$

Donc, en utilisant la question 2 de l'exercice 27 :

$$\text{tr}(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)) = \text{tr}(P \text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) P^{-1}) = \text{tr}(\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) P^{-1} P) = \text{tr}(\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)).$$

Donc  $\text{tr}(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f))$  ne dépend pas du choix de  $\mathcal{B}$  base de  $E$ .

2. D'après le théorème du rang :  $\dim \ker f = \dim E - \text{rg } f = n - 1$  donc soit  $(e_1, \dots, e_{n-1})$  une base de  $\ker(f)$ .  
Comme  $(e_1, \dots, e_{n-1})$  est libre, d'après le théorème de la base incomplète, il existe  $e_n$  tel que  $\text{mathcal{B}} = (e_1, \dots, e_n)$  soit une base de  $E$ .  
Alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & a_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_n \end{pmatrix}$$

, avec  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ .

On a donc  $\text{tr}(f) = a_n$  et :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^2) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & a_1 a_n \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_n^2 \end{pmatrix} = a_n \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \text{tr}(f) \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f).$$

Ainsi :

$$f^2 = \text{tr}(f)f.$$



## Problème 8 (Problème supplémentaire 37)

- 1.

$$\begin{aligned} u &= 1 + e^{i\theta} = e^{i\theta/2} (e^{-i\theta/2} + e^{i\theta/2}) \\ &= 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\theta/2}. \end{aligned}$$

Donc :

- si  $\theta \in [0, \pi[$ , comme  $\cos(\frac{\theta}{2}) > 0$  on a :  $|u| = 2 \cos(\frac{\theta}{2})$  et  $\frac{\theta}{2}$  est un argument de  $u$ ,
  - si  $\theta = \pi$ , alors  $u = 0$  donc  $|u| = 0$  et  $u$  n'a pas d'argument,
  - si  $\theta \in ]\pi, 2\pi]$ , comme  $\cos(\frac{\theta}{2}) < 0$  on a  $u = -2 \cos(\frac{\theta}{2}) e^{i(\theta/2 + \pi)}$  donc :  $|u| = 2 \cos(\frac{\theta}{2})$  et  $\frac{\theta}{2} + \pi$  est un argument de  $u$ .
2. (a) i. •  $P_1 = \frac{1}{2i}((X+i)^3 - (X-i)^3) = \frac{1}{2i}(6iX^2 - 2i) = 3X^2 - 1$ ,  
•  $P_2 = \frac{1}{2i}((X+i)^5 - (X-i)^5) = \frac{1}{2i}(10iX^4 - 20iX^2 + 2i) = 5X^4 - 10X^2 + 1$ .  
ii. •  $\deg(P_1) = 2$  donc  $P_1 \in \mathbb{R}_2[X]$  et le discriminant de  $P_1$  est  $\Delta = 12 \geq 0$  donc  $P_1$  n'est pas irréductible dans  $\mathbb{R}[X]$ .  
•  $\deg(P_2) = 4$  donc  $P_2 \in \mathbb{R}_4[X]$  donc  $P_2$  n'est pas irréductible dans  $\mathbb{R}[X]$ .
- (b) i. •  $\deg(X+i)^{2n+1} = \deg(X-i)^{2n+1} = 2n+1$  donc  $\deg P_n \leq 2n+1$ .  
• Le coefficient du terme en  $X^{2n+1}$  dans  $P_n$  est :  $\frac{1}{2i}(1-1) = 0$  donc  $\deg P_n \leq 2n$ . Ainsi  $P_n \in \mathbb{C}_{2n}[X]$ .  
• Le coefficient du terme en  $X^{2n}$  dans  $P_n$  est :  $\frac{1}{2i}((2n+1)i - (2n+1)(-i)) = 2n+1 \neq 0$  donc  $\deg P_n = 2n$  et son coefficient dominant est  $2n+1$ .  
ii. Les racines  $N$ -ièmes de l'unité sont :

$$e^{2ik\pi/N}, k \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket.$$

- iii.

$$P_n(i) = \frac{1}{2i} (2i)^{2n+1} = (2i)^{2n} = 2^{2n}(-1)^n = (-4)^n.$$

- iv. Soit  $z$  une racine de  $P_n$ . Alors  $(z+i)^{2n+1} = (z-1)^{2n+1}$  donc  $|z+i| = |z-i|$ .  
Ainsi  $z$  est sur la médiatrice des points d'affixes  $i$  et  $-i$  donc  $z$  est sur l'axe des abscisses.  
Donc les racines de  $P_n$  sont réelles.

v.

$$\begin{aligned}
 P_n(a) = 0 &\iff a \neq i \text{ et } \left(\frac{a+i}{a-i}\right)^{2n+1} = 1 \\
 &\iff a \neq i \text{ et } \exists k \in \llbracket 0, 2n \rrbracket, \frac{a+i}{a-i} = e^{2ik\pi/(2n+1)} \\
 &\iff a \neq i \text{ et } \exists k \in \llbracket 0, 2n \rrbracket, a+i = (a-i)e^{2ik\pi/(2n+1)} \\
 &\iff a \neq i \text{ et } \exists k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a(1 - e^{2ik\pi/(2n+1)}) = -i(1 + e^{2ik\pi/(2n+1)})
 \end{aligned}$$

Pour  $k = 0$ , l'équation devient :  $0 = -2i$  ce qui est impossible. Ainsi,  $k = 0$  n'est pas solution et  $i$  n'est pas racine de  $P_n$ .

On a donc :

$$P_n(a) = 0 \iff \exists k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket, a(1 - e^{2ik\pi/(2n+1)}) = -i(1 + e^{2ik\pi/(2n+1)}).$$

vi.

$$\begin{aligned}
 P_n(a) = 0 &\iff \exists k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket, a(1 - e^{2ik\pi/(2n+1)}) = -i(1 + e^{2ik\pi/(2n+1)}) \\
 &\iff \exists k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket, a = \frac{-i(1 + e^{2ik\pi/(2n+1)})}{1 - e^{2ik\pi/(2n+1)}} \\
 &\iff \exists k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket, a = \frac{-ie^{ik\pi/(2n+1)}(e^{-ik\pi/(2n+1)} + e^{ik\pi/(2n+1)})}{e^{ik\pi/(2n+1)}(e^{-ik\pi/(2n+1)} - e^{ik\pi/(2n+1)})} \\
 &\iff \exists k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket, a = \frac{-2i \cos\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}{-2i \sin\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)} \\
 &\iff \exists k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket, a = \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)} \\
 &\iff \exists k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket, a = \frac{1}{\tan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}
 \end{aligned}$$

Ainsi les racines de  $P_n$  sont :

$$\frac{1}{\tan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}, k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket,$$

qui sont réelles.

vii.

$$\begin{aligned}
 P_n &= \frac{1}{2i} \left[ \sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} X^{2n+1-k} i^k - \sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} X^{2n+1-k} (-i)^k \right] \\
 &= \frac{1}{2i} \sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} X^{2n+1-k} i^k (1 - (-1)^k) \\
 &= \frac{1}{i} \sum_{\substack{k \in \llbracket 0, 2n+1 \rrbracket \\ k \text{ impair}}} \binom{2n+1}{k} X^{2n+1-k} i^k \\
 &= \frac{1}{i} \sum_{p=0}^n \binom{2n+1}{2p+1} X^{2n-2p} i^{2p+1} \\
 &= \sum_{p=0}^n \binom{2n+1}{2p+1} X^{2(n-p)} (-1)^p
 \end{aligned}$$

Posons  $Q_n = \sum_{p=0}^n \binom{2n+1}{2p+1} X^{n-p} (-1)^p$ . On a :

$$Q_n(X^2) = P_{2n}(X).$$

- viii. •  $P_1 = 3X^2 - 1$  donc  $Q_1 = 3X - 1$  et la racine de  $Q_1$  est  $\frac{1}{3}$ ,  
 •  $P_1 = 5X^4 - 10X^2 + 1$  donc  $Q_2 = 5X^2 - 10X + 1$  et les racines de  $Q_2$  sont  $\frac{10 \pm \sqrt{80}}{10} = 1 \pm \frac{2}{\sqrt{5}}$ .  
 ix. Soit  $z \in \mathbb{C}$ . Soit  $z' \in \mathbb{C}$  tel que  $z'^2 = z$ , alors :

$$Q_n(z) = 0 \Leftrightarrow Q_n(z'^2) = 0 \Leftrightarrow P_n(z') = 0.$$

Donc les racines de  $Q_n$  sont les carrés des racines de  $P_n$ .

3. Soit  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $\frac{k\pi}{2n+1} \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$ . Ainsi, les  $\frac{1}{\tan\left(\frac{k\pi}{(2n+1)}\right)}$  sont tous positifs et deux à deux distincts. Donc les  $\frac{1}{\tan^2\left(\frac{k\pi}{(2n+1)}\right)}$  sont deux même deux à deux distincts. Ainsi,  $Q_n$  admet  $n$  racines réelles distinctes et  $\deg(Q_n) = n$ . Donc  $Q_n$  est scindé à racines simples dans  $\mathbb{R}[X]$ .

De plus,  $S_n$  est la somme des racines de  $Q_n$ .

Le coefficient en dominant de  $Q_n$  vaut  $\binom{2n+1}{1} = 2n+1$ .

Le coefficient en  $X^{n-1}$  de  $Q_n$  vaut  $\binom{2n+1}{3}(-1) = \frac{(2n+1)2n(2n-1)}{3!} = \frac{(2n+1)n(2n-1)}{3}$ .

D'après les relations coefficients racines, on a :

$$S_n = -\frac{(2n+1)n(2n-1)}{3(2n+1)} = -\frac{n(2n-1)}{3}.$$

4. Posons  $f : x \mapsto \sin x - x$  et  $g : x \mapsto \tan x - x$ .

$f$  et  $g$  sont dérivables sur  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ .

Soit  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , on a  $f'(x) = \cos(x) - 1 \leq 0$  et  $g'(x) = 1 + \tan^2(x) - 1 = \tan^2(x) \geq 0$ .

Ainsi,  $f$  est décroissante et  $g$  est croissante sur  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ .

Donc :  $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ,  $f(x) \leq f(0)$  et  $g(x) \geq g(0)$ .

Donc :

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], f(x) \leq 0 \text{ et } g(x) \geq 0.$$

D'où :

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], 0 \leq \sin(x) \leq x \text{ et } x \leq \tan(x).$$

Enfin :  $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ,  $0 \leq \sin x$ . Soit  $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ , on a :  $0 < \sin x \leq x \leq \tan x$ .

Donc :  $0 < \frac{1}{\tan x} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\sin x}$ .

D'où :  $0 < \frac{1}{\tan^2(x)} \leq \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{\sin^2(x)} = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\sin^2(x)} = 1 + \frac{\cos^2(x)}{\sin^2(x)}$ .

Or,  $\cos(x) \neq 0$ .

Donc  $\frac{\cos^2(x)}{\sin^2(x)} = \frac{1}{\frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)}} = \frac{1}{\tan^2(x)}$ .

Donc :

$$0 < \frac{1}{\tan^2(x)} \leq \frac{1}{x^2} \leq 1 + \frac{1}{\tan^2(x)}.$$

5. • Comme  $2 > 1$ ,  $\sum \frac{1}{k^2}$  est une série de Riemann convergente.  
 • Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , soit  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $\frac{k\pi}{2n+1} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ , d'après la question précédente, on a :

$$\frac{1}{\tan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)} \leq \frac{1}{\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)^2} \leq 1 + \frac{1}{\tan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}.$$

En sommant pour  $k$  allant de 1 à  $n$ , on obtient :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\tan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)^2} \leq \sum_{k=1}^n \left[1 + \frac{1}{\tan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right].$$

Donc :

$$S_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{(2n+1)^2}{k^2 \pi^2} \leq n + S_n.$$

D'où :

$$S_n \leq \frac{(2n+1)^2}{\pi^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq n + S_n.$$

Donc :

$$\frac{n(2n-1)\pi^2}{3(2n+1)^2} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq \frac{\pi^2}{(2n+1)^2} \left[ n + \frac{n(2n-1)}{3} \right].$$

$$\text{Or, } \frac{n(2n-1)\pi^2}{3(2n+1)^2} \sim \frac{2n^2\pi^2}{3 \times 4n^2} \text{ donc } \frac{n(2n-1)\pi^2}{3(2n+1)^2} \sim \frac{\pi^2}{6} \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(2n-1)\pi^2}{3(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

$$\text{De même, } \frac{\pi^2}{(2n+1)^2} \left[ n + \frac{n(2n-1)}{3} \right] = \frac{\pi^2}{(2n+1)^2} \times \frac{2n^2+2n}{3} \sim \frac{\pi^2 2n^2}{3 \times 4n^2}.$$

$$\text{Donc } \frac{\pi^2}{(2n+1)^2} \left[ n + \frac{n(2n-1)}{3} \right] \sim \frac{\pi^2}{6}. \text{ Ainsi, } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi^2}{(2n+1)^2} \left[ n + \frac{n(2n-1)}{3} \right] = \frac{\pi^2}{6}.$$

Ainsi, par encadrement :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$